MOLUSDERM®

TRAITEMENT DES LÉSIONS DU MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

SOLUTION CUTANÉE
À RINCER

Distributeur/Distributor:
MOULIN ROYAL COSMETICS
19 avenue de Cambridge,
14200 Hérouville-Saint-Clair
FRANCE

Laboratorios Viñas
Provença 386 - 08025 Barcelona
ESPAÑA/SPAIN

CE 0051
Dispositif médical

MRC LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT D'UTILISER MOLUSDERM®
CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR SON UTILISATION

ATTENTION!
Ce produit est corrosif et doit être rincé.

INDICATION
Traitement localisé du *Molluscum contagiosum* de la peau.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

CE PRODUIT EST CORROSIF, IL EST UTILISÉ COMME AGENT CAUTÉRISANT. APPLIQUEZ LA SOLUTION UNIQUEMENT ET STRICTEMENT SUR LES LÉSIONS À TRAITER, RINCER APRES APPLICATION ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INDICATIONS D'UTILISATION.

- Ne pas appliquer sur une même lésion plus de 10 jours de suite.
- Ne pas appliquer sur une peau saine.
- Ne pas appliquer chez des enfants de moins de 2 ans.
- Ne pas appliquer sur des zones de peau fine ou sensible telles que les muqueuses ou le contour des yeux. La substance ne doit en aucun cas entrer en contact avec les yeux.
- Ne pas appliquer sur des peaux irritées ou infectées, rougies ou présentant des signes d'inflammation.
- Ne pas appliquer sur des peaux ayant un aspect anormal.
- Ne pas appliquer sur des verrues.
- Ne pas avaler. Son utilisation sur le visage n'est pas recommandée.
- Ne pas utiliser en cas de *Molluscum contagiosum* infecté.
- Ne convient pas aux diabétiques. La guérison de la zone traitée peut être plus lente ou incomplète.
- Ne pas utiliser pendant l'allaitement sur les parties du corps qui pourraient entrer en contact avec le nourrisson.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un de ses composants.
- Il est important d'éviter le grattage ou la manipulation des lesions traitées tant que le molluscum n'a pas complètement disparu afin d'éviter des surinfections.
- Tenir le produit hors de la portée des enfants.
- Éviter le contact avec les vêtements ou autres matières pouvant être altérés par les alcalis.

En cas de contact accidentel :
- Si le produit pénètre dans les yeux, rincez immédiatement à grande eau pendant 15 minutes, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui cette notice.
- Si le produit entre en contact avec la peau saine, rincez immédiatement à grande eau.
- Ne vous frottez pas les yeux ni les muqueuses si le produit est entré en contact avec vos doigts. Lavez-vous les mains immédiatement.

En cas de doute, demander l'avis à un professionnel de santé.

MODE D'EMPLOI

Le produit doit être appliqué **1 fois par jour**, sauf indication contraire de votre médecin. Une fois appliqué, laisser sécher pendant 1 à 2 minutes, puis rincer. Appliquer MOLUSDERM® sur la lésion perpendiculairement avec la pointe du pinceau sans toucher la peau saine.

Répétez l'application tous les jours **jusqu'à l'apparition d'une rougeur**, d'une irritation ou d'une inflammation à la base de la lésion, ce qui se produit normalement 4 à 6 jours plus tard. À ce moment-là, **vous devrez arrêter le traitement** et ne plus l'appliquer sur ce point.

L'inflammation est le signe que le *Molluscum contagiosum* va disparaître, ce qui se produira dans les 2 à 5 semaines suivantes.

Vous pouvez poursuivre l'application quotidienne sur les lésions où l'inflammation ne s'est pas produite jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Schéma d'application correcte de MOLUSDERM® et d'évolution des lésions :



APPLICATION
Appliquer sur la lésion MOLUSDERM® en une seule touche – une fois par jour. Appliquer perpendiculairement avec la pointe du pinceau sans toucher la peau saine. Laisser sécher (1 à 2 minutes).



RINÇAGE
Rincer ensuite les lésions avec une compresse de gaze imprégnée d'eau.
Se laver les mains après utilisation.



ROUGEUR
Après 4 à 6 jours, la rougeur, l'irritation ou l'inflammation apparaît habituellement à la base de la lésion.
Lorsque cela se produit, arrêter les applications sur cette lésion.

LE MOLLUSCUM DISPARAÎT
2 à 5 semaines plus tard, le molluscum disparaîtra définitivement.

MISE EN GARDE : Si le traitement est poursuivi au point où la rougeur, l'irritation ou l'inflammation est déjà apparue, une ulcération (semblable à une brûlure) de la zone traitée peut se produire.

N'appliquez pas la solution sur la même lésion plus de 10 jours de suite. Si vous oubliez de l'appliquer un jour, ne le faites pas deux fois le lendemain. Appliquez-la de nouveau une seule fois et continuez jusqu'à l'apparition de la rougeur.

COMMENT APPLIQUER LE PRODUIT ?

L'application de ce produit doit être effectuée exclusivement par un adulte.
Les enfants ne doivent pas manipuler le produit ni le toucher avec les mains lorsqu'il a été appliqué par l'adulte.

ÉTAPE 1 : APPLICATION
Dévissez le bouchon du flacon et introduisez l'applicateur (pinceau) à l'intérieur.
Retirez l'applicateur, imprégné du produit, et appliquez le produit **verticalement en touchant légèrement chaque lésion avec la pointe du pinceau de la manière la plus précise possible** sans badigeonner.



Pour les applications postérieures, vous pouvez garder le produit avec l'applicateur vissé.
Éviter de badigeonner ou de toucher la peau saine autour du molluscum car cela pourrait provoquer une irritation ou des brûlures.

ATTENTION ! Ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau saine ou toute autre surface (vêtement, surfaces délicates, etc.). Il s'agit d'une substance corrosive. Si cela se produit, rincez immédiatement à grande eau.

ÉTAPE 2 : SÉCHAGE (ATTENDRE 1 ou 2 MINUTES)
Une fois le produit appliqué (étape 1), laissez sécher le produit pendant environ 1 ou 2 minutes.
Ne pas toucher les parties traitées pendant le temps de séchage. S'assurer que l'enfant ne touche pas les parties traitées pendant le temps de séchage.

ÉTAPE 3 : RINÇAGE
Après le séchage, rincez la zone à l'eau (à l'aide d'une compresse de gaze imbibée par exemple) pour éliminer les restes de produit, puis lavez-vous les mains à grande eau.

Le traitement peut entraîner des brûlures et irritation s'il n'est pas rincé.

RÉPÉTER CES 3 ÉTAPES SUR CHAQUE MOLLUSCUM À TRAITER, 1 FOIS PAR JOUR.

Arrêtez immédiatement le traitement de chaque lésion dès l'apparition d'une irritation, d'une rougeur ou d'une inflammation. Une fois l'inflammation apparue, le traitement de cette lésion sera alors terminé et il faudra attendre quelques semaines pour que le molluscum disparaisse.

Vous devez jeter le flacon quatre semaines après la première ouverture. *Ne jetez pas ce produit dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Retournez-le chez votre pharmacien.*

EFFETS SECONDAIRES INDÉSIRABLES

Le traitement peut provoquer des démangeaisons, des douleurs et une sensation de brûlure transitoire au site d'application.
Le traitement peut entraîner des brûlures et lésions cutanées lorsque notamment de produit est utilisé sur peau saine ou n'est pas rincé.

Une hyperpigmentation ou une hypopigmentation peut apparaître après la disparition du *Molluscum contagiosum* traité. Celle-ci disparaîtra spontanément.

En cas de survenue d'effets indésirables liés à l'utilisation de MOLUSDERM®, consultez un médecin.

Si vous avez des raisons de croire qu'un incident grave est survenu en lien avec l'utilisation du dispositif, veuillez le reporter à l'autorité nationale et au fabricant.

COMPOSITION : hydroxyde de potassium à 10 %, eau.

QU'EST-CE QU'UN MOLLUSCUM CONTAGIOSUM ET LE PRODUIT MOLUSDERM ?

Le *Molluscum contagiosum* (molluscum) est une infection virale de la peau bénigne et contagieuse causée par un poxvirus.
Cette affection provoque l'apparition de papules ou de nodules sur la peau. Elle est fréquente chez les enfants, généralement de 2 à 5 ans, mais peut aussi toucher les jeunes et les adultes.



Lésions typiques de Molluscum contagiosum

Pour éviter la propagation du virus, évitez le grattage, le contact de la zone touchée (peau avec peau) avec d'autres individus ou par l'intermédiaire de serviettes, éponges, baignades, piscines, etc.

L'hydroxyde de potassium à 10 % de MOLUSDERM® est un produit au pH très alcalin, corrosif, à l'action cautérisante qui agit sur la peau au niveau externe, en dénaturant les substances protéiques des tissus.

PRESENTATION:

MOLUSDERM®, solution cutanée, est présenté dans un dispositif étanche avec un pinceau applicateur.
Il contient 3 g de solution.

Garder cette notice jusqu'à la fin de la durée de vie du produit.

Date de marquage CE : Février 2013

Date de révision de la notice d'instruction: Juillet 2019

MRC LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE